

DIVERSITY OF VEGETATION FLORISTIC COASTAL IN THE AREA OF TLEMCCEN (ALGERIA WESTERN)

HASSIBA STAMBOULI - MEZIANE & MOHAMED BOUAZZA

Department of Ecology and Environment, University of Tlemcen, Tlemcen, Algeria

ABSTRACT

This study is devoted to the analysis of the vegetation of coastal dunes in the region of Tlemcen. Results were obtained on these in general, including the biological and ecological. These results allowed us to individualize different phytosociological classes:

The Cakiletea maritimae and Ammophiletea for cash at the beach; the Thero Brachypodietea and Quercetea ilicis in the sand dune and fixed dunes. Class Cakiletea maritimae and Ammophiletea grouped species of embryonic dunes.

Thero Brachypodietea class includes species of sand dune. The class of Quercetea ilicis includes species of the dunes most advanced and most determined. Using phytosociological data and plant dynamics, we understand the evolution of the vegetation and its diversity.

KEYWORDS: Phytoecology, Phytosociology, Coast, Dune, Diversity, Algeria

INTRODUCTION

Mediterranean coastal ecosystems are characterized by strong climatic constraints and pedological salinity, wind, drought and shallow soils or mobile. While moving of the beach to the interior, we find a succession of landscape elements of dunes whose character and morphological vegetal is linked to the progressive modification of ambience salinity, wind power and sandy motions. The work we present here concerns the coastal vegetation since the beach of Beni Saf up Marsat Ben M'hidi Figure 1. This one is related to a high proportion of sand, always greater than 60%. The vegetation of the region of Tlemcen provides a good example of study of the plant diversity and above all interesting synthesis of natural ecosystem dynamics, coastal. This type of work has been addressed by several authors. Quote Mainly [1], [2], [3] and [4].

MATERIALS AND METHODS

The study covers the analysis of the distribution of species in the coastal region of Tlemcen: Study sites were chosen. From the beach Beni Saf up Marsat Ben M'hidi, we have specified the distribution of taxa and identify the botanical and ecological components of these species. They help us to better understand the vegetation dynamics but also to better understand the ecological factors.

For this we chose two areas repartees as follows:

- Representative areas them live dunes and dune embryonic (from the beach Beni-Saf up to Marsat Ben M'hidi).
- Zones representing the semi-fixed dunes (Ghazaouet cement factory station (Beni-Saf)).

These 2 areas differ from each another by: geographical location, climate, topography, edaphic conditions, anthropogenic factors and plant diversity.

Stratify From sampling, we have selected 10 study sites representative so the study of coastal vegetation in the region of Tlemcen.

Each of these stations has several fundamentally different situations.

These stations are localized in the western part of the north-western Algeria.

They are located between 1 ° and 1 ° 27_ 51_ west longitude and 34 ° and 35 ° 27_ 18_ north latitude. The zone is restricted geographically:

- To the north by the Mediterranean Sea;
- The south by the mounts of Tlemcen;
- To the west by the Algéro-Moroccan border;
- To the east by the wilaya of Témouchent.

Béni Saf

Those lands are limestone lithothamniées rich in fossil shells lumachellique of type post- tablecloths Miocene rest on these limestones intercalations clays to sandstone Tortonian age (Miocene). The limestones constitute a plateau called "Sidi Safi plateau" from which is calcium carbonate noted for cement plant Beni Saf These limestones are covered with places by volcanic formations of type basaltic, Guardia [12].

Rachgoune

The station is located at the mouth of Tafna. These are the dune deposits at "El Guedim" and, on the right bank of the Oued, in these dunes appear basalt flows black color inter stratified with the volcanic tuffs, Guardia [12].

Genesis of Sea Dunes

Under the effect of erosion, sand particles are going to move grace to winds to feed the dune ridge of coastline.

Dunes

The wind pushes the sand which will hang on waste brought by the sea. This forms a hump get bigger and bigger. This is the birth of a dune where embryonic going to develop a ephemeral vegetation based on: *Medicago marina*; *Cakile maritima*; *Euphorbia paralias*. According to [13], dune is a deposition of sand edified by the wind into coming up against various obstacles such as vegetation and asperities terrain encountered between the beach and the mainland.

The dynamics of dunes depends on the one hand of the Wind speed and the dimension of sand particles and, on the other hand, obstacles which are the vegetation or the reliefs. As a function of the latter we distinguish 04 kinds of dunes.

The High Dunes: Encountered the vicinity of the sea (beach Rachgoune, Beidar, Egla M'Khaled)

Dunes on Slopes: Are on slopes exposed to the sea (the valleys Rachgoune)

Suspended Dunes: Are formed on the cliffs parallel to neighborhood of the sea (Ouled Ayad)

Dunes Clad: Depots constitutes tackles against of the scree of slope. It is characterized by a vegetation based on: *Crucianella maritima*, *Thymelaea hirsuta* and *Elichrysum stoechas*.(Marsat Ben M'hidi)

The bioclimatic study for two periods (1913-1938) and (1970-2002) Figure 2 showed a vertical indent of each station in direct relation with the Q2 Emberger. Station Ghazaouet, despite falling on of the value of Q2 always under floor lower semi-arid to hot winter

This climate favors the extension of a vegetation therophytic xerophyte.

RESULTS AND DISCUSSIONS

Due to all this work it is possible to present specify the distribution of taxa and identify botanical and ecological components of coastal vegetation of the region of Tlemcen [11] Figure 3. This vegetation is distributed at 63 Studied Families. The genres most represented belong to two families (22 and 14 Asteraceae Poaceae). These two families alone represent more than 40% of the flora species studied Figure 4. Some families (Cupressaceae, Ephedraceae, Frankeniaceae and Convolvulaceae) are a very small percentage, but play an extremely important role in the genesis and the formation of dunes (eg, *Juniperus phoenicea* family Cupressaceae which fixes the stabilizing the dunes.

The number of families ranges from 06 for the beach of Beni Saf reaching a maximum of the 17a 18 families for beach Egla there by characterizing embryonic dunes, in inwards pointing the number of families increases is the case of the 02 stations Ghazaouet and Rachgoune representative so semi-fixed dunes even fixed for the case of the station of Beni Saf (the cement plant). The biological types are conditioned by environment factors determines the type and physiognomic of the vegetation. We determined the biological spectra of these formations. The enumeration of species by biological types is performed on all the species inventoried in each part and gives us the global list the following compositions:

Table 1 and Figure 4 show that the distribution of biological types within these formations remains very heterogeneous. These spectra show a reduction, or even the total absence of phanerophytes due essentially to phenomena of degradation and an increase therophytes especially in stations Beider and Ghazaouet (79.14% and 85%). The composition of general spectrum accuses predominance of therophytes in relation to other. The diagram of the study area is of type **Figure 5: Therophytes > Chamaephytes > Geophytes > Hemicryptophytes > Phanerophytes.**

Ghazaouet station and the valleys of Rachgoune show a complete lack of the phanerophytes and dominance of the therophytes. These therophytes have the ability to withstand the stresses imposed on by sand. The character of therophytisation these stations, and in particular their geographical position has enabled us to classify them among the back-dunes whose are the first influenced by the ocean spray (embryonic dunes) and the by the following steppic (littoral dunes). The percentage of therophytes of other stations (Beni-saf, Beach of then Rechgoune, Egla M'Khaled and Ghazaouet) seems more or less balanced with 57.14%, 58.16%, 77.77% and 50% respectively.

Hemicryptophytes are totally absent in the beach Ouled Ben Ayad Ben and Marsat M'hidi, this can be explained by the poverty of soil organic matter and weak altitude (about 100 m) represented by these stations. This phenomenon has been confirmed by [5]: Indeed, the abundance of hemicryptophytes is explained by richness in organic matter in forest and altitude. Despite the importance of therophytes, the chamaephytes keeping an important part in them vegetation. They are better adapted to aridity.

For our case we recorded a percentage 21 to 27%, and among species met: we have

- *Ziziphus lotus*
- *Lavandula stoechas*
- *Lavandula multifida*

- *Ulex boivinii*
- *Ulex parviflorus*

and finally, geophytes are everywhere less dominant with only 8 to 11%. They are represented by:

- *Asparagus acutifolius*
- *Asparagus stipularis*
- *Iris xiphium*
- *Orchis morio*
- *Serapias neglecta*
- *Orchis maculata*

In the stations of Rachgoune and Beidar, geophytes are completely absent [10] are also larger proportions in geophytes in Mediterranean region in steppic domain. Their climatic rigors and structural instability of the soil (sandy substrate) foster the development of species to be short life cycle, more or less demanding to the needs hydric and trophic. [9] Points out that the highlands Algerians the increase is in relation of therophytes with a gradient of increasing aridity.

The importance of therophyte is in direct relation with the disturbance index which has been calculated from the number of species encountered in our floristic surveys. For full stations, this index remains high in relation to results [8] in Tunisia where there is obtained 70% as high value.

For our case, the disturbance index being of the order of 81% **Table 2** for the entire study area, the high degradation engendered by action of man is distinctly visible (clearing, fires grazing and urbanization). In this context, [7] report that the disturbances caused by humans and his herds are numerous and correspond to two situations more severe ranging of the matorralisation up of desertification passing by the steppisation.

The importance of the disruption index is proportional to the dominance of therophytes who find here their favorable environment for their development (sandy substrate, Poverty in organic matter) again reflecting a more open environment. These ephemeral species resistant constraints imposed by the wind (movement of sand particles) and sea spray. They are also called passive dryland because they stop all metabolic activity during adverse conditions.

This index shows the therophytisation of the zone follows a steppisation which is treated as the ultimate stage of degradation of different ecosystems with the species dominance sub- nitrophilous related to overgrazing [7]

CONCLUSIONS

The study of the vegetation of the littoral has enabled us to bring out the following results:

The group Poaceae, Asteraceae, Fabaceae and Caryophyllaceae unquestionably dominates the field.

The biological type "therophytes" largely dominates them stations studied in the coastal come second them chamaephytes, geophytes and finally hemi cryptophytes. The latter, according to [5] require a medium rich in organic matter and a strong altitude, which is not for our case Phanerophytes by against are totally absent in the valleys of Rachgoune and Ghazaouet; but shyly represented (with 2%) in the beaches of Rachgoune and Beidar.

The calculation of the index of perturbation is proportional to the species dominance therophytic in all the stations studied. The dominant character is linked therophytisation to swamping of annual species, disseminated by the herds, especially in the study area. In this regard, [6] explains the by therophytisation ultimate stage of degradation of the ecosystems with species sub-nitrophilous related to overgrazing.

REFERENCES

1. L. Zeraïa, Essai d'interprétation comparative des données écologiques, phénologiques et de production subéro-ligneuse dans les forêts de chêne liège de Provence cristalline (France méditerranéenne et d'Algérie), Th. Doc. Univ. Aix-Marseille III, 1981, 370 pp.
2. M.M. Dahmani, Le chêne vert en Algérie. Syntaxonomie phytosociologie et dynamique des peuplements, Thèse doct. Es-sciences, Univ. Houari Boumediene, Alger, 1997, 383 pp.
3. P. Quezel, Réflexion sur l'évolution de la flore et de la végétation au Magreb Méditerranéen, Ibis Press Edit., Paris, 2000, 117 pp.
4. M. Bouazza, N. Benabadi, Composition floristique et pression anthropozoïque au Sud-Ouest de Tlemcen, Rev. Sci. Tech. Univ. Constantine, Algérie, 1998, pp. 93–97.
5. M.Barbero, G .Bonin, R. Loisel, et P.Quezel, Sclerophyllus *Quercus* forests of the mediterranean area: Ecological and ethological significance Bielefelder Okol. Beitr. 1989,pp.1-23.
6. M. Barbero, P.Quezel et S. Rivas-Martinez, Contribution à l'étude des groupements forestiers et pré-forestiers du Maroc. Phytosocoologia Phytosocoologia, 1981 9(3): 311-412.
7. M. Barbero, R.Loisel, et P.Quezel, - Les apports de la phyto-écologie dans l'interprétation des changements et perturbations induits par l'homme sur les écosystèmes forestiers méditerranéen. Forêts méditerranéenne, 1990 SII : 194-215.
8. A.El Hamrouni, la végétation forestière et pré-forestière de la Tunisie : typologie et éléments pour la gestion. Thèse Doct. Es-sci. Univ. Aix-Marseille III 1992. 220p.
9. Aidoud, Contribution à l'étude des écosystèmes steppiques du sud oranais: phytomasse, productivité primaire et applications pastorales. Thèse Doct. 3^{ème} cycle. U.S.T.H.B. Alger, 1983 245 P+ annexes.
10. A.DANIN, et G. ORSHAN, The distribution of Raunkiaer life forms in Israel in relation to the environment. Journal of vegetation science 1990 1: 41-48.
11. J. Favennec, Guide de la flore des dunes littorales de la Bretagne au Sud des Landes, Edition sud ouest/ONF, 2002.
12. P. Guardia, Géodynamique de la marge alpine du continent Africain d'après l'étude de l'Oranie occidentale. Relation structurale et paléogéographique entre le rif extérieur, le tell et l'avant pays atlasique, Thèse 3^{ème} cycle, Univ. Nice, 1975, 285 pp.

APPENDICES




Figure 1: Location of Studies Stations




Figure 2: Temperature and Humidity within them Different Zones




Figure 3: The Percentage of Families of Littoral of Species




Figure 4: Type the Biological Species from Coastline of Rachgoune




Figure 5: Type Biological of the Coastal Species of Ghazaouet and Ouled Ben Ayad




Figure 6: Type Biological of the Coastal Species of Béni Saf




Figure 7: Type Biological of the Coastal Species of Eglia and M' Khaled




Figure 8: Type Biological of the Coastal Species of Beidar and Marsat Ben M'hidi

Table 1: Biological Types of Littoral in Percentage

Biological Types		PH	CH	HE	GE	TH	All
Beach of Béni- Saf	Nbr	16	37	9	18	68	148
	%	10.81	25.67	6.08	12.16	45.94	
Beach of Rachgoune	Nbr	1	4	1	0	21	27
	%	3.70	14.81	3.70	0	77.77	
Valleys of Rachgoune	Nbr	0	10	0	5	41	56
	%	0	18	0	9	74	
Beach of M'Khaled	Nbr	1	6	2	3	12	24
	%	4.16	25	8.33	12.5	50	
Beach of Eglia	Nbr	1	6	1	1	12	21
	%	7.76	21.57	4.76	4.76	57.14	
Ghazaouet Beach Ouled Ayad	Nbr	0	2	0	2	22	26
	%	0	7.69	0	7.69	84.61	
Beidar	Nbr	1	5	1	0	27	34
	%	2.94	14.70	2.94	0	79.14	
Station of Béni-Saf	Nbr	2	14	2	5	31	54
	%	3.7	25.9	3.7	9.2	4.7	
Station of Ghazaouet	Nbr	2	13	2	4	30	51
	%	7.8	25.4	3.9	7.8	58.8	

Table 1: Contd.,

Marsat Ben M'hidi	Nbr	1	8	0	1	16	26
	%	3.84	30.76	0	3.84	61.53	
The Study Area	Nbr	25	284	18	48	181	556
	%	0.44	51.04	3.23	8.63	32.55	

Table 2: Disturbance Index of Stations Studied

Station	Disturbance Index
Beach of Béni-Saf	71.62%
La Station of Rachgoune	92%
Les Vallées of Rachgoune	92.59%
Beach of M'Khaled	75%
Station of Béni Saf	83%
Station of ghazaouet	84%
Beach of Egla	85%
Beach of Ben Yard	92%
Beach of Beidar	94%
Marsat of Ben M'hidi	92%
The Study Area	79%

Table 3: Them Floristic Surveys of the Beach and Valleys of Rachgoune

Station: Valleys of Rachgoune, Beach and Siga																
Exposition : North-South																
Recovery: 60-70%																
Altitude (m)		172	180	205	204	214	206	190	209	212	160	185	180	210	200	160
Genres Species	Survey	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Ammophila arenaria</i> (L.) Link.	Poacées										+					
<i>Anagalis arvensis</i> L.	Primulacées	0	0	+	+					+		+				
<i>Asperula hirsuta</i> L.	Rutacées	0	0	+	+	1	1						+	+		
<i>Asphodelus microcarpus</i> Salzm et Viv.	Liliacées	0	0	0	+											
<i>Avena sterilis</i> L.	Poacées	0	0	0	+							+				
<i>Bromus rubens</i> L.	Poacées											+				
<i>Cakile maritime</i> Scop.	Brassicacées										1					
<i>Calendula arvensis</i> L.	Astéracées	3	0													+
<i>Calycotome spinosa</i> (L.) Link.	Fabacées	2	2	1	+	1	1									
<i>Calystegia soldanella</i> L.	Convolvulacées										1					
<i>Centaurium umbellatum</i> (Gibb.) Beck.	Gentianacées	+	1	2	+	+		+								
<i>Chamaerops humilis</i> L.	Palmacées	0	0	0	1											
<i>Chrysanthemum grandiflorum</i> (L.) Batt.	Astéracées									+	+	+				
<i>Chrysanthemum coronarium</i> L.	Astéracées											+				
<i>Cistus monspeliensis</i> L.	Cistacées	2	2	3	4	3	4	+	3	3	2		1	2		1
<i>Cistus salvifolius</i> L.	Cistacées	2	2	2	2		+	1								
<i>Cladanthus arabicus</i> (L.) Cass.	Astéracées	2	2	3	4		2	+	+			3	1	2		3
<i>Cuscuta sp</i> (Tourn.) L.	Cuscutacées															+
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Poacées	1	0		+	+										
<i>Daucus carota</i> L.	Apiacées	2	0	2	+	1										
<i>Daucus carota subsp gummifer</i> Lamk.	Apiacées									1	+					
<i>Echinops spinosus</i> L.	Apiacées									1	+				+	
<i>Echinophora spinosa</i> L.	Apiacées										1		+			
<i>Echium vulgare</i> Tourn.	Borraginacées	3	0		+		+							+	+	
<i>Ephedra fragilis</i> Desf.	Ephedracées									1	+					
<i>Erica multiflora</i> L.	Ericacées	1	1	1	2	2				1	+					
<i>Euphorbia paralias</i> L.	Euphorbiacées									1	1	1				
<i>Euphorbia peplis</i> L.	Euphorbiacées	0	0	0	+											
<i>Fagonia cretica</i> L.	Zygophyllacées	3	0													
<i>Gla diolus segetum</i> Ker-Gawl.	Iridacées									+						
<i>Globularia alypum</i> L.	Globulariacées	2	0			+										
<i>Gnaphalium luteo-album</i> L.	Astéracées	0	0	0	0	+			1			+				1
<i>Hedysarum sp</i> L.	Fabacées	2	1		2			+	+							3
<i>Inula crithmoides</i> L.	Astéracées			+					+							

Table 3: Contd.,

<i>Juncus maritimus</i> Lamk.	Juncacées									1	+					2
<i>Juniperus oxycedrus</i> L.	Cupressacées	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4					4
<i>Juniperus phoenicea</i> L.	Cupressacées	0	0	+	1		+					2				2
<i>Lagurus ovatus</i> L.	Poacées	2	0									1				1
<i>Limonium sinuatum</i> (L.) Mill.	Linacées	0	0	0	0	0	0	+								
<i>Linum strictum</i> L.	Linacées	3	0					+		+	1	1				
<i>Lygeum spartum</i> L.	Poacées											1				
<i>Marrubium vulgare</i> L.	Lamiacées	0	0	0	0	0	+	+				+				4
<i>Medicago marina</i> L.	Fabacées	0	0	0	0	0	0	0	0		1	2	2	+		3
<i>Medicago minima</i> Grufb.	Fabacées	0	0	0	0	0	0	0	+		1					
<i>Medicago littoralis</i> Rhode.	Fabacées										1					
<i>Mesembryanthemum nodiflorum</i> L.	Aizoacées	0	0	0	+											
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	Liliacées	0	0	0	0	0	0	0	+							
<i>Myrtus communis</i> M.	Myrtacées	0	+				+	+		+						
<i>Olea europaea</i> L.	Oléacées	0	0	0	0	0	0	+	+							
<i>Ononis spinosa</i> L.	Fabacées	+	0													3
<i>Ononis natrix</i> L.	Fabacées	0	0	0	0	+				+	1		+		1	
<i>Paronychia argentea</i> (Pourr.) Lamk.	Caryophyllacées	2	0	1	+											+
<i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass.	Astéracées	2	2	3	3	2	3	+		+	2					
<i>Phragmites communis</i>	Poacées									+		+				+
<i>Pinus halepensis</i> L.	Pinacées	1	0											1		
<i>Pinus maritima</i> L.	Pinacées	2	0	3	1		1	4	2	2	1					1
<i>Pistacia lentiscus</i> L.	Oléacées	0	0	+	+	+										
<i>Plantago argentea</i> Desf.	Plantaginacées	3	0									1				
<i>Plantago lagopus</i> L.	Plantaginacées									+	1			+	1	
<i>Plantago marina</i> L.	Plantaginacées	0	2	2			+					1				
<i>Plantago psyllium</i> L.	Fabacées	0	1	2			+									
<i>Quercus coccifera</i> L.	Fagacées	3	2	2								3				
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Brassicacées	0	0	0	+											
<i>Reichardia tingitana</i> (L.) Roth.	Astéracées	0	0	0	+											
<i>Rhamnus alaternus</i> L.	Rhamnacées	0	0	0	0	0	1			1	+					+
<i>Rhamnus lycioides</i> L.	Rhamnacées	1	1			1	+			1	1					
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Lamiacées									1	+					
<i>Rubia peregrina</i> L.	Rubiacées															1
<i>Rubia sp.</i>	Rubiacées	0	0	4	4		+									
<i>Salicornia ramosissima</i> L.	Chénopodiacées									+	+					
<i>Scabiosa stellata</i> L.	Dipsacacées	2	1	3	2	1	+		2	+	2					+
<i>Scorpiurus vermiculatus</i> L.	Fabacées									1	+					
<i>Senecio leucanthemifolius</i> Poiret.	Astéracées			+								+	+			
<i>Silene coeli-rosa</i> (L.) A.Br.	Caryophyllacées			+								2			2	1
<i>Silene maritima</i> L.	Caryophyllacées	2	2			2										
<i>Spartium junceum</i> L.	Fabacées	+	1	3	4	3	3			1	2					
<i>Teucrium fruticans</i> L.	Lamiacées	0	1							+	1					
<i>Teucrium polium</i> L.	Lamiacées									+	1	+				
<i>Thymus ciliatus</i> Desf.	Lamiacées									1	+	+				3
<i>Trifolium stellatum</i> L.	Fabacées	0	1	0	+	1		+		+	1			+		
<i>Ulex parviflorus</i> Pourret.	Fabacées	0	0	0	1		+								+	

Table 4: Them Floristic Surveys of the Beach Egla and M'Khaled

Station of Honaine: Beach M'Khaled and Egla									
Exposition: North									
Covering Rates: 25-30%									
Substrate: Silicious									
Altitude (m)						60	78	41	66
						59	56	50	
Genres Species						1	2	3	4
						5	6	7	
<i>Ampelodesma mauritanica</i> (Poiret) Dur.et Sch.								2	
<i>Anagallis arvensis</i> L.									+
<i>Arenaria emarginata</i> Brot.						2	+		
<i>Asparagus stipularis</i> Forsk .								+	+
<i>Asteriscus maritimus</i> (L.) Less.						3	3	3	3
<i>Astragalus lusitanicus</i> Lamk							1		
<i>Atractylis concellata</i> L.									1
<i>Blakstonia perfoliata</i> L.									+

Table 4: Contd.,

<i>Bupleurum protractum Hoffmet Link.</i>	Apiacées	+	+		+	1		+
<i>Calycotome spinosa (L.) Link.</i>	Fabacées	+	+	1	+		1	
<i>Centaurium umbellatum (Gibb). Beck.</i>	Palmaracées	1	+	1	1	1		
<i>Chrysanthemum coronarium L.</i>	Cistacées				1			
<i>Cistus monspeliensis L.</i>	Cistacées				1	1		
<i>Cladanthus arabicus (L.) Cass.</i>	Convolvulacées					1		
<i>Dactylis glomerata L.</i>	Poacées	3	2	1	+	2	1	
<i>Daucus carota L.</i>	Apiacées			+		1		
<i>Daucus carota subsp gummifer Lamk.</i>	Apiacées					1		
<i>Erica multiflora L.</i>	Ericacées					1		
<i>Erodium moschatum (Burm) L'Her.</i>	Géraniacées	+						
<i>Eryngium tricuspidatum L.</i>	Apiacées		+					
<i>Eryngium maritimum L.</i>	Apiacées	+		+	3	3		
<i>Fagonia cretica L.</i>	Zygophyllacées					+	+	
<i>Hedysarum sp L.</i>	Fabacées		1	4	3	2		
<i>Helianthemum pilosum (L.) Pers.</i>	Cistacées		+		1	+		
<i>Hordeum murinum Witth.</i>	Poacées	1				+		
<i>Inula crithmoides L.</i>	Astéracées	1						
<i>Juniperus phoenicea L.</i>	Cupressacées	2	3	3	2	1		
<i>Lavandula dentata L.</i>	Lamiacées	+	+	1	+	1	+	
<i>Limonium sinuatum (L.) Mill.</i>	Plumbaginacées	1			+			
<i>Linum strictum L.</i>	Linacées	1			1			
<i>Lolium rigidum Gaud.</i>	Poacées		1		+	4		
<i>Lycium europaeum L.</i>	Solanacées	1			1			
<i>Lygeum spartum L.</i>	Poacées	2	1	1	3	3		
<i>Ononis natrix L.</i>	Fabacées				2			
<i>Phagnalon saxatile (L.) Cass.</i>	Astéracées	+	1	1	2			
<i>Phillyrea angustifolia L.</i>	Oléacées			+		+		
<i>Pinus halepensis L.</i>	Pinacées		+	1				
<i>Pinus maritima L.</i>	Pinacées					+		
<i>Pistacia lentiscus L.</i>	Oléacées	1	2	2	1	1		
<i>Rosmarinus officinalis L.</i>	Lamiacées		+	1	1	1		
<i>Rubia peregrina L.</i>	Rubiacees							1
<i>Rubia sp L.</i>	Rubiacees		1					
<i>Rumex bucephalophorus L.</i>	Polygonacées			+				1
<i>Scabiosa stellata L.</i>	Dipsacacées	1						
<i>Satureja graeca L.</i>	Lamiacées		+	2	1	1		
<i>Sedum acre L.</i>	Crassulacées	2		1	2	2		
<i>Senecio leucanthemifolius Poiret.</i>	Astéracées	1	1			1		
<i>Silene coeli-rosa (L.) A.Br.</i>	Caryophyllacées	+						
<i>Silene maritima L.</i>	Caryophyllacées		+			+		
<i>Smilax aspera L.</i>	Liliacées			2				
<i>Suaeda maritima (L.) Dumort.</i>	Chénopodiacées			1				
<i>Taraxacum officinalis L.</i>	Astéracées		+				+	
<i>Tamarix gallica L.</i>	Tamaricacées			+				
<i>Teucrium polium L.</i>	Lamiacées					+	+	
<i>Thymelaea hirsuta Endl.</i>	Thymeleacées				+			
<i>Ulex parviflorus Pourret.</i>	Fabacées		1	1	1			

Table 5: Them Floristic Surveys of Beach of Moskarda; the Border; Beider and Marsat Ben M'hidi

Station: Beach of Moskarda and the Border											
Exposition: North											
Covering Rates: 10-30%											
Altitude (m)		6	16	40	2	101	59	350	400	340	410
Genres Species	Survey Families	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Allium nigrum</i> L.	Liliacées		+							+	
<i>Allium roseum</i> L.	Liliacées								+		
<i>Alopecurus pratensis</i> L.	Poacées						+				
<i>Ammophila arenaria</i> (L.) Link.	Poacées			2	4						
<i>Ampelodesma mauritanica</i> (Poiret) Dur.et Sch.	Poacées					1					
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Primulacées							1		+	
<i>Antirrhinum majus</i> L.	Scrofulariacées								3		
<i>Arenaria emarginata</i> Brot.	Caryophyllacées									+	1
<i>Artemisia herba alba</i> Asso.	Astéracées							+			
<i>Asparagus stipularis</i> Forsk .	Liliacées		+						1		
<i>Asperula hirsuta</i> L.	Rubiacées		1			+					
<i>Asteriscus maritimus</i> (L.) Less.	Astéracées		2			2	2		1	1	+
<i>Astragalus lusitanicus</i> Lamk	Fabacées								1	1	+
<i>Atriplex halimus</i> L.	Chénopodiacees		3					2	1	+	1
<i>Avena sterilis</i> L.	Poacées			1							
<i>Ballota hirsuta</i> Benth	Lamiacées								1		
<i>Bellis annua</i> L.	Astéracées			1							
<i>Blakstonia perfoliata</i> L.	Gentianacées							1	1		
<i>Bromus madritensis</i> L.	Poacées						1			+	+
<i>Bromus rubens</i> L.	Poacées									+	1
<i>Cakile maritima</i> Scop.	Brassicacées	1		2							
<i>Calendula arvensis</i> L.	Astéracées									+	
<i>Calycotome spinosa</i> (L.) Link.	Fabacées					2			+		
<i>Calystegia soldanella</i> L.	Astéracées				2						
<i>Catananche coerula</i> L.	Astéracées								+		
<i>Centaurea pullata</i> L.	Gentianacées		1	1		+	1		1	1	+
<i>Centaureum umbellatum</i> (Gibb). Beck.	Palmaracées					2			1		
<i>Chamaerops humilis</i> L.	Chénopodiacees					1	2				
<i>Chenopodium album</i> L.	Astéracées		3	1						1	+
<i>Chrysanthemum grandiflorum</i> (L.) Batt.	Astéracées			1						+	1
<i>Chrysanthemum coronarium</i> L.	Cistacées	2	2	1					2	+	
<i>Cistus monspeliensis</i> L.	Cistacées			*		1					
<i>Cistus salvifolius</i> L.	Astéracées			*		1			1		
<i>Convolvulus althaeoides</i> L.	Convolvulacées					1		+			
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Poacées					1	2	1		1	+
<i>Daucus carota</i> L.	Apiacées								2		
<i>Daucus carota</i> subsp <i>gummifer</i> Lamk.	Apiacées	+		1	1				1		
<i>Echinops spinosus</i> L.	Apiacées			1							
<i>Echium vulgare</i> Tourn.	Borraginacées		1	*						+	1
<i>Ephedra fragilis</i> Desf.	Ephedracées						+				
<i>Eryngium tricuspidatum</i> L.	Apiacées			1					1		
<i>Eryngium maritimum</i> L.	Apiacées					1					
<i>Euphorbia peplis</i> L.	Euphorbiacées			*		1	1	+			
<i>Gnaphalium luteo-album</i> L.	Astéracées								2	2	3
<i>Halimium halimifolium</i> (L.) Willk.	Cistacées			*		1					

Table 5: Contd.,

<i>Helianthemum pilosum</i> (L.) Pers.	Cistacées			1						+	1
<i>Hippocrepis multisiliquosa</i> L.	Brassicacées									1	+
<i>Inula crithmoides</i> L.	Astéracées				1						
<i>Juncus maritimus</i> Lamk.	Juncacées			*		2			+	2	3
<i>Juniperus phoenicea</i> L.	Cupressacées			*					1		
<i>Lagurus ovatus</i> L.	Poacées			*		2	2	2	2		
<i>Lavandula dentata</i> L.	Lamiacées		1								
<i>Lavatera maritima</i> Gouan.	Malvacées		2						+	1	+
<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.	Brassicacées	4		2	1					1	+
<i>Lolium rigidum</i> Gaud.	Poacées		2				+		1		
<i>Lycium europaeum</i> L.	Solanacées							2			
<i>Lygeum spartum</i> L.	Poacées		1								
<i>Matthiola sinuata</i> (L.) R. Br.	Fabacées	3	3	2	4						
<i>Medicago marina</i> L.	Fabacées			3	2						
<i>Medicago littoralis</i> Rhode.	Fabacées								2		
<i>Mercurialis annua</i> L.	Euphorbiacées	1									
<i>Ononis variegata</i> L.	Fabacées	3	3	2	2						
<i>Orobanche</i> sp	Orobanchacées					+				+	+
<i>Periploca laevigata</i> Auct.	Asclépiadacées									1	
<i>Paronychia argentea</i> (Pourr.) Lamk.	Caryophyllacées					1	1	1			
<i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass.	Astéracées					+					
<i>Phillyrea angustifolia</i> L.	Oléacées		1		2						
<i>Phragmites communis</i>	Poacées					3					
<i>Pinus maritima</i> L.	Pinacées					+	2	+	+		
<i>Plantago argentea</i> Desf.	Plantaginacées									+	
<i>Plantago lagopus</i> L.	Plantaginacées									+	1
<i>Plantago marina</i> L.	Plantaginacées							2			
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Brassicacées	2	2	1							
<i>Reseda alba</i> L.	Résédacées					1					
<i>Reichardia tingitana</i> (L.) Roth.	Astéracées					1					
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Lamiacées					+					
<i>Rubia</i> sp L.	Rubiacées					2	2				
<i>Rumex bucephalophorus</i> L.	Polygonacées									1	+
<i>Ruta chalepensis</i> L.	Rutacées								1		
<i>Salicornia ramosissima</i> L.	Chénopodiacées					+	2				
<i>Scabiosa slellata</i> L.	Dipsacacées								2		
<i>Scorpiurus vermiculatus</i> L.	Fabacées	2	1	1	2					1	+
<i>Sedum acre</i> L.	Crassulacées								1		
<i>Senecio leucanthemifolius</i> Poiret.	Astéracées		1	1				2			
<i>Smilax aspera</i> L.	Liliacées			*		1					
<i>Spartium junceum</i> L.	Fabacées	+	2	1	1			2	2		
<i>Stipa tortilis</i> Desf.	Poacées				1						
<i>Suaeda maritima</i> (L.) Dumort.	Chénopodiacées					1					
<i>Taraxacum officinalis</i> L.	Astéracées			*			2	1	1		
<i>Thymelaea hirsuta</i> Endl.	Thymeleacées		1			1			1	1	2
<i>Thymus ciliatus</i> Desf.	Lamiacées					1					
<i>Trifolium angustifolium</i> L.	Fabacées			*		2	+	2	1		
<i>Ulex parviflorus</i> Pourret.	Fabacées					1					

Table 6: Them Floristic Surveys of Beach of Ouled Ben Ayad

Station: Ouled Ben Ayed					
Exposition: north east					
Covering Rates: 40-50%					
Substrate: silicious					
Altitude (m)		185	16	40	20
Genres Species	Survey	1	2	3	4
<i>Alopecurus pratensis</i> L.	Poacées	+		+	
<i>Arenaria emarginata</i> Brot.	Caryophyllacées	+		+	+
<i>Asteriscus maritimus</i> (L.) Less.	Astéracées	1	+	+	+
<i>Atriplex halimus</i> L.	Chénopodiacées	+			+
<i>Avena sterilis</i> L.	Poacées	+		+	+
<i>Bromus madritensis</i> L.	Poacées	1		+	1
<i>Bromus rubens</i> L.	Poacées	+			1
<i>Cakile maritima</i> Scop.	Brassicacées	+		+	+
<i>Centaurea pullata</i> L.	Astéracées	+	+	+	+
<i>Chrysanthemum grandiflorum</i> (L.) Batt.	Astéracées	1	1	+	+
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Poacées	1		+	1
<i>Erodium moschatum</i> L.	Géraniacées	+	+	+	+
<i>Frankenia laevigata</i> L.	Frankeniacees	+	+	+	+
<i>Gnaphalium luteo-album</i> L.	Astéracées	+		+	+
<i>Hedysarum</i> sp L.	Fabacées	1	1	1	+
<i>Hippocrepis multisiliquosa</i> L.	Brassicacées	+		+	+
<i>Hordeum murinum</i> Witth.	Poacées	1	1	+	+
<i>Inula crithmoides</i> L.	Astéracées	+		+	+
<i>Lagurus ovatus</i> L.	Poacées	1	1	1	+
<i>Lavatera maritima</i> Gouan.	Malvacées	1	1	+	+
<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.	Brassicacées	+		+	+
<i>Lolium rigidum</i> Gaud.	Poacées	+		+	1
<i>Lotus ornithopoides</i> L.	Fabacées	+		+	+
<i>Malva sylvestris</i> L.	Malvacées	+		+	+
<i>Matthiola sinuata</i> (L.) R. Br.	Fabacées	1	+		+
<i>Medicago marina</i> L.	Fabacées	+	1	1	+
<i>Medicago littoralis</i> Rhode.	Fabacées	+	+	+	+
<i>Medicago minima</i> Grufb.	Fabacées	+		+	
<i>Oxalis pes-caprae</i> L.	Oxalidacées	+		+	+
<i>Orchis purpurea</i> L.	Orchidacées	+	+		+
<i>Ononis natrix</i> L.	Fabacées		1	+	
<i>Paronychia argentea</i> (Pourr.) Lamk.	Caryophyllacées		+		+
<i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass.	Astéracées	+		+	+
<i>Plantago lagopus</i> L.	Plantaginacées	+	+		+
<i>Plantago marina</i> L.	Plantaginacées	+		+	+
<i>Plantago psyllium</i> L.	Plantaginacées	+	1		+
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Brassicacées	1	1	1	+
<i>Reichardia tingitana</i> (L.) Roth.	Astéracées	+		+	+
<i>Senecio leucanthemifolius</i> Poiret.	Astéracées	+		+	+
<i>Silene maritima</i> L.	Caryophyllacées	+		+	+
<i>Suaeda maritima</i> (L.) Dumort.	Chénopodiacées	+	+		+
<i>Trifolium angustifolium</i> L.	Fabacées	+			+
<i>Trifolium stellatum</i> L.	Fabacées	+		+	

Table 7: Them Floristic Surveys of Beach of Beni Saf; Sidi Boucif and Sid Safi

Station: Beach of Beni Saf		Station: Beach of Sidi Boucif												Station: Beach of Sidi Safi							
Exposition: North		Exposition: North												Exposition: North							
Covering Rates: 05-10%		Covering Rates: 20-25%												Covering Rates: 10-20%							
Altitude (m)		190	209	212	160	191	191	200	200	210	210	210	200	200	271	273	270	260	215	202	180
GENRES SPECIES	Survey	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<i>Andropogon hirtus</i> L.	Poacées	+		+	1											+		+		+	
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Primulacées															+		+		+	
<i>Arenaria emarginata</i> Brot.	Caryophyllacées	1	+		1	1		+	+	1	1	+	+	+							
<i>Asparagus stipularis</i> Forsk.	Liliacées	1		+	1	1	1	+	+	+	+	+	+								
<i>Asteriscus maritimus</i> (L.) Less.	Astéracées						+	+	+	+	+	+	+		1	+	1	1		1	+
<i>Atractylis concellata</i> L.	Astéracées	+														+					
<i>Atractylis pycnocephalus</i> L.	Astéracées	+														+					
<i>Atriplex halimus</i> L.	Chénopodiacées				+													+			
<i>Avena sterilis</i> L.	Poacées					+					+		+								
<i>Bellis annua</i> L.	Astéracées					+	+	+	+	+	+										
<i>Bupleurum protractum</i> Hoffm. et Link.	Apiacées	1		1	+																
<i>Bromus rubens</i> L.	Poacées					+					+							1			
<i>Calycotome spinosa</i> (L.) Link.	Fabacées	+		+												+					
<i>Calystegia soldanella</i> L.	Astéracées	1		+	+																
<i>Catananche coerula</i> L.	Astéracées	1	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
<i>Centaurea pullata</i> L.	Gentianacées						+													+	
<i>Chamaerops humilis</i> L.	Chénopodiacées	+		+	1										3	+			+	1	
<i>Chenopodium album</i> L.	Astéracées														+						
<i>Chrysanthemum grandiflorum</i> (L.) Batt.	Astéracées														+						
<i>Chrysanthemum coronarium</i> L.	Cistacées	+		1																	+
<i>Cuscuta</i> sp (Tourn.) L.	Cuscutacées						+														+
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Poacées					+	+	+													
<i>Daucus carota</i> subsp gummifer Lamk.	Apiacées	1		1	+										+	1		2	1		1
<i>Delphinium peregrinum</i> L.	Renonculacées														+		+				
<i>Echinophora spinosa</i> L.	Apiacées	1		+	+																
<i>Echium vulgare</i> Tourn.	Borraginacées																1				
<i>Ephedra fragilis</i> Desf.	Ephedracées														+	1					
<i>Erica arborea</i> L.	Ericacées	+																			
<i>Erica multiflora</i> L.	Ericacées	1	+		+		1	+		+	+			+	+						
<i>Erodium moschatum</i> (Burn.) L'Her.	Géraniacées																				
<i>Eryngium tricuspidatum</i> L.	Apiacées					+		+	+	+		+	+	+							
<i>Eryngium maritimum</i> L.	Apiacées																				1
<i>Fagonia cretica</i> L.	Zygophyllacées														+						
<i>Globularia alypum</i> L.	Globulariacées														2	+		3	+	1	1
<i>Gnaphalium luteo-album</i> L.	Astéracées					+		+	+	+	+	+	+	+							
<i>Halimium halimifolium</i> (L.) Willk.	Cistacées														1				1	1	+
<i>Hedysarum</i> sp L.	Fabacées	2	3	1	+																+
<i>Hordeum murinum</i> Witth.	Poacées					+				+											
<i>Inula crithmoides</i> L.	Astéracées		1											+							
<i>Juncus maritimus</i> Lamk.	Juncacées														2	1					
<i>Juniperus phoenicea</i> L.	Cupressacées	1	2	2	1	+		+		1					2	2				1	
<i>Lagurus ovatus</i> L.	Poacées														1	+	+		2		1
<i>Lavandula stoechas</i> L.	Lamiacées					+				+				+							
<i>Lavandula dentata</i> L.	Lamiacées	1	+	+	1																
<i>Limonium sinuatum</i> (L.) Mill.	Phumbaginacées														+		+			1	+
<i>Linum strictum</i> L.	Linacées																	+			
<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.	Brassicacées	+	1		+			1						+							
<i>Lotus ornithopoides</i> L.	Fabacées	1	+		1																
<i>Malva sylvestris</i> L.	Malvacées																	1			
<i>Marrubium vulgare</i> L.	Lamiacées														3	3			1		
<i>Medicago marina</i> L.	Fabacées							+	+	+	+	+	+	+			1	1		1	
<i>Medicago littoralis</i> Rhode.	Fabacées							+	+	+	+	+	+	+							
<i>Mesembryanthemum nodiflorum</i> L.	Aizoacées	1	+		+																
<i>Ononis spinosa</i> L.	Fabacées														1				+		
<i>Periploca laevigata</i> Auct.	Asclépiadacées															+	1	1			
<i>Paronychia argentea</i> (Pourr.) Lamk.	Caryophyllacées					+		+	+	+	+	+	+	+	+						
<i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass.	Astéracées	1	+	+	2																
<i>Pinus maritima</i> L.	Pinacées														1	+					+
<i>Pistacia lentiscus</i> L.	Oléacées	1		2	1										+	+		+			
<i>Plantago argentea</i> Desf.	Plantaginacées														+		1				
<i>Plantago marina</i> L.	Plantaginacées	1		+											1	1		+	1	2	
<i>Plantago psyllium</i> L.	Plantaginacées							+	+	+	+	+	+	+							
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Brassicacées					1	+	+	+	+	+	+	+	+			1				+
<i>Reseda alba</i> L.	Résédacées																				+
<i>Reichardia tingitana</i> (L.) Roth.	Astéracées					+		+	+	+	+	+	+	+							
<i>Reseda lutea</i> L.	Résédacées	+		+	+										1				+		
<i>Rhamnus alaternus</i> L.	Rhamnacées																	1	2		+
<i>Rhamnus lycioides</i> L.	Rhamnacées					+					+		+	*							
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Lamiacées	+	1		1																
<i>Rubia peregrina</i> L.	Rubiacées			+																	
<i>Rumex bucephalophorus</i> L.	Polygonacées	1		1	+	+	+				+	+									
<i>Ruta chalepensis</i> L.	Rutacées							1	1	1	+		+	+							
<i>Salicornia ramosissima</i> L.	Chénopodiacées																	+			1
<i>Satureja graeca</i> L.	Lamiacées	+	1	1																	
<i>Scorpiurus vermiculatus</i> L.	Fabacées														+			3	1		
<i>Sedum acre</i> L.	Crassulacées	+		1		+		+	+	+	+	+	+	+							
<i>Senecio leucanthemifolius</i> Poiret.	Astéracées														1			1			
<i>Silene maritima</i> L.	Caryophyllacées														3	2		1	2	1	1
<i>Smilax aspera</i> L.	Liliacées														4	3	+		+	3	4
<i>Stipa tortilis</i> Desf.	Poacées					+						+									
<i>Taraxacum officinalis</i> L.	Astéracées	+		+		+			+	+	+	+	+	+	+				1	+	+
<i>Tamarix gallica</i> L.	Tamaricacées																				
<i>Teucrium polium</i> L.	Lamiacées	+	1	+	1											3		+	1	1	1
<i>Trifolium stellatum</i> L.	Fabacées														2	1				+	1
<i>Ulex parviflorus</i> Pourret.	Fabacées											+	+	+							